LEKI I LAKTACJA BOOTCAMP

WAKACYJNY BOOTCAMP 22-23 CZERWCA 2024

seminaria i warsztaty ONLINE, 2x6h

6. Problemy Laktacyjne: Zapalenie piersi

6. PROBLEMY LAKTACYJNE CZ II. ZAPALENIE PIERSI

Zapalenie piersi

Zapalenie piersi

Proponowane postępowanie

Kobiete karmi piersią i obawia się że boli pierś

Wśród wytycznych antybiotykoterapii zalecana, żadna nie zdecydowanie dla skaleczenia

Antybiotykoterapia zalecana

- Amoksycylina
  - Kwas amoksycylinowy 875 mg + sulbactam 125 mg
  - Amoksycylina 500 mg
  - Amoksycylina 1000 mg
- Fenoksymetylopenicylina
  - Fenoksymetylopenicylina potasowa 1000 mg
  - Fenoksymetylopenicylina benzatynowa 1200 000 j.m.
- Cefalosporyny I generacji
  - Cefalexin 500 mg
  - Cefadroxil 500 mg
- Makrolidy
  - Azytromycyna 500 mg
  - Klarytromycyna 500 mg
  - Erytromycyna 500 mg
- Linkosamidy
  - Klindamycyna 300 mg
- Fluorochinolony
  - Ciprofloksacyna 500 mg
  - Levofloksacyna 500 mg
- Sulfonamidy
  - Kotrimoksazol 160 mg + 800 mg
- Nitrofurany
  - Nitrofurantoina 100 mg
- Tetracyklina
  - Doksycyklina 100 mg
- Glikopeptydy
  - Wankomycyna 500 mg
- Ansamycyny
  - Rifampicyna 300 mg
- Inne
  - Metronidazol 500 mg
  - Tinidazol 500 mg
  - Fosfomycyna 3 g

Antybiotykoterapia odroczona

Wdrożenie leczenia zaraz po ustąpieniu objawów, jeśli nie ustępują w ciągu 24 godzin

Jeśli objawy się nasilają, lub pojawiają się nowe objawy

Zalecenie dawki w zależności przez Stillmeg w nocy na dobę

Antybiotykoterapia odroczona

- Cefuroksym
  - Cefuroksyl 250 mg
  - Cefuroksyl 500 mg
- Cefpodoksym
  - Cefpodoksyl proksetil 100 mg
  - Cefpodoksyl proksetil 200 mg
  - Cefpodoksyl proksetil 400 mg
- Cefdinir
  - Cefdinir 300 mg
- Cefotaksym
  - Cefotaksym 1 g
- Ceftriakson
  - Ceftriakson 1 g
- Cefepim
  - Cefepim 1 g
- Ceftazidim
  - Ceftazidim 1 g
- Karbapenemy
  - Meropenem 1 g
  - Imipenem 500 mg
- Monobaktamy
  - Aztreonam 1 g
- Aminoglikozydy
  - Gentamycyna 80 mg
  - Tobramycyna 80 mg
  - Amikacyna 500 mg
- Inne
  - Chloramfenikol 1 g
  - Kwas fusydowy 500 mg
  - Kotrimoksazol 160 mg + 800 mg
  - Nitrofurantoina 100 mg
  - Doksycyklina 100 mg
  - Wankomycyna 500 mg
  - Rifampicyna 300 mg
  - Metronidazol 500 mg
  - Tinidazol 500 mg
  - Fosfomycyna 3 g

Kiedy zapalenie piersi wymaga

- Szybki gdy się objawy ogólne
- zwiększenie ale w przypadku zakażenia bądź brak wyjątkowo

Antybiotykoterapia

- Pierwszy wybór
  - Amoksycylina
  - Kwas amoksycylinowy
- Alternatywa
  - Kwas amoksycylinowy
- Antybiotyki
  - Amoksycylina
  - Kwas amoksycylinowy
  - Amoksycylina kwas klavulanowy
  - **Zwykle stosuje się 250 mg do 500 mg co 8 godzin**

Parametr	Wartość	Jednostka
Farmakokinetyka		
Biodostępność	90 - 95	%
Wiązanie z białkami	18	Odsetek
Proteoliza żołądkowa	74	%
pKa	2.4	Pkg
pH	5.75	
Vmax	1 - 2	Vmax
Km	15.5 - 7	Kpm
Maksymalne Stężenie	150 - 0.85	mg/kg/d
Wydalanie Nerkowe	60 - 0.4	%
Półokres Życia	0.96 - 0.1	h

- Dla dziecka
  - Wybór kwas amoksycylinowy
  - Dawkowanie
  - Dawkowanie
  - Dawkowanie